I'm not a robot

المبادئ التوجيهية للالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى ؟

[illegible] H. influenzae يكون الالتهاب الرئوي المزمن [illegible] أكثر شيوعًا بين البالغين الذين لديهم اضطرابات رئوية مزمنة كامنة مثل الداء الانسدادي الرئوي المزمن (COPD) [illegible] Mycoplasma pneumoniae المفطورة الرئوية Chlamydophila pneumoniae المتدثرة الرئوية الأليفة Haemophilus influenzae المستديمة النزلية Streptococcus pneumoniae تنطوي الأسباب البكتيرية الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع على: العقدية الرئوية

. يمكن أن يصيب الالتهاب الرئوي أي شخص، ولكنه أكثر شيوعًا عند الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. يمكن أن تختلف أسباب الالتهاب الرئوي، وأكثرها شيوعًا هي الأسباب البكتيرية أو الفيروسية العدوى غالبًا ما يحدث الالتهاب الرئوي الجرثومي بسبب العقدية الرئوية، في حين أن الفيروسات مثل تأثير [illegible] Pseudomonas aeruginosa [illegible] (CA-MRSA) المكتسبة من المجتمع والمقاومة للميثيسيلين Staphylococcus aureus الالتهاب الرئوي الذي يكون مقاومًا لبعض أنواع المضادات الحيوية، وتُعرف هذه البكتيريا بالعنقودية الذهبية Staphylococcus aureus مباشرةً. تُسبب العنقودية الذهبية

[illegible] (RSV). يمكن أن يحدث الالتهاب الرئوي بسبب [illegible] عادة ما يحدث الالتهاب الرئوي بسبب بكتيريا أو فيروسات أو فطريات تصيب الرئتين. ومن بين مسببات الأمراض البكتيرية الشائعة العقدية الرئوية، والمستدمية النزلية، والميكوبلازما الرئوية. يمكن أن تؤدي الفيروسات مثل الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي أيضًا إلى الالتهاب الرئوي. في حالات نادرة، تكون العدوى الفطرية مثل

[illegible] تُستخدم الأشعة السينية للصدر عادةً لتشخيص الالتهاب الرئوي من خلال إظهار مناطق العدوى في الرئتين. يمكن أن تساعد فحوصات الدم في تحديد الكائن الحي المحدد المسبب للالتهاب الرئوي وتقييم شدة

Health :عند استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي. يعد [illegible] (HAP) Hospital-acquired Pneumonia [illegible]. الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى يكتسب بعض المرضى العدوى المسببة للالتهاب الرئوي أثناء اقامتهم في المستشفى للعلاج من اضطراب مرضي آخر، وتزداد فرصة الاصابة الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى (بالإنجليزية

[illegible] ساب بالالتهاب الرئوي، حيث أن الرئتين تحتوي على نظام دفاع ضد البكتيريا والفيروسات [illegible]

ز التنفس الصناعي. العاملين في مجال الرعاية الصحية، قد ينتقل الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى، حيث يمكنهم نقل الجراثيم بين الأشخاص عبر أدواتهم، أو [illegible] [3]: إذا كانوا يعانون من إدمان الكحول. إذا خضعوا لعمليات جراحية في الصدر أو جراحة كبرى أخرى. إذا كانوا يعانون من ضعف جهاز مناعة بسبب العلاج الكيميائي، [illegible] يجدر بالذكر أنه قد

تكون العلامة الأولى للالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى عند كبار السن هي التغيرات العقلية أو الارتباك.[2] تشخيص الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى قد يطلب الطبيب إجراء عدة اختبارات لتشخيص الحالة، وتشمل [illegible]

[illegible] (Mandell & Niederman, 2019) من المضاعفات الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى فترات إقامة أطول في المستشفى وزيادة تكاليف الرعاية الصحية وارتفاع معدلات الوفيات. الالتهاب الرئوي الشفطي: يحدث هذا النوع من الالتهاب الرئوي عند استنشاق الطعام أو السائل أو المواد الأخرى إلى الرئتين، مما يسبب العدوى VAP يعد

ريضية، حيث يساعد في معالجة العدوى ومنع المضاعفات. فيما يلي دليل خطوة بخطوة لممارسي الرعاية الصحية حول كيفية استخدام خطة الرعاية التمريضية للالتهاب الرئوي (NCP) تعد خطة الرعاية التمريضية للالتهاب الرئوي. (GERD) يُعد الالتهاب الرئوي الشفطي أكثر شيوعًا لدى الأفراد الذين يعانون من صعوبات في البلع أو ضعف الوعي أو مرض الارتجاع المعدي المريئي

الدم ودرجة الحرارة. تقييم استجابة المريض للعلاجات وتعديل خطة الرعاية وفقًا لذلك، يعد أمرًا بالغ الأهمية أيضًا في عملية المعالجة. في بعض الحالات، قد يكون دخول المستشفى ضروريًا لعلاج الالتهاب الرئوي، خاصة إذا كانت الأعراض حادة أو إذا كان المرض معقدًا. قد يحتاج المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أخرى أو الذين لا يستجيبون للعلاج بالمضادات الحيوية [illegible] للعلاج بالمضادات الحيوية الفموية إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج بواسطة الوريد. قد يكون دخول المستشفى ضروريًا أيضًا إذا كان هناك مضاعفات مثل الانصباب الجنبي أو الفشل التنفسي. في هذه الحالات، يمكن أن يوفر المستشفى الرعاية المكثفة والمراقبة الدقيقة التي يحتاجها المريض. بعد الشفاء، ينصح الأطباء بمتابعة الحالة من خلال التصوير بالأشعة السينية

أ. سي، ميتيرسكي، إم إل، كلومباس، م.، موسيديري، ج.، سويني، د. أ.، بالمر، إل بي، نابوليتانو، إل إم [illegible]

مضاعفات مثل الانصباب الجنبي أو الفشل التنفسي. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الممرضة تقييم الحالة العامة للمريض، بما في ذلك مستوى الوعي وحالة الترطيب والقدرة على السعال وإزالة الإفرازات. الهدف من رعاية الالتهاب الرئوي هو إدارة الأعراض ومنع المضاعفات وتعزيز التعافي. ويشمل ذلك توفير العلاج بالأكسجين والمضادات الحيوية إذا لزم الأمر والرعاية الداعمة مثل الترطيب وإدارة الألم. يحتاج الشخص المصاب بالالتهاب الرئوي عادةً إلى رعاية داعمة، بما في ذلك العلاج بالأكسجين والمضادات [illegible]